

7,5 cm



J.A Saúde Animal

Diclotril®

USO VETERINÁRIO



Antimicrobiano de amplo espectro e Anti-inflamatório

FÓRMULA

Cada 100 mL do produto contém:

Cloridrato de Enrofloxacinina	10,00 g
Diclofenaco de Sódio	3,75 g
Veículo q.s.p.	100,00 mL

INDICAÇÕES

Diclotril® é um antimicrobiano de amplo espectro e ação rápida que combate enfermidades causadas por bactérias Gram-positivas, Gram-negativas e Micoplasmas. É especialmente indicado nas infecções entéricas, respiratórias, em mastites, pododermatites, onfaloflebites, anaplasmose, septicemia, profilaxia de cirurgias e infecções após o parto.

Diclotril® possui em sua formulação o Diclofenaco de Sódio, o que possibilita um combate rápido a dor, a febre e a inflamação presente nas infecções bacterianas.

BOVINOS

Mastite (*Streptococcus* spp. e *Staphylococcus* spp.), metrite (*Escherichia coli*), anaplasmose (*Anaplasma* spp.), actinobacilose (*Actinobacillus* spp.), síndrome e febre dos transportes (associação da *Pasteurella* spp. e de *Haemophilus* spp.), onfaloflebite e feridas infectadas causadas por *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp. e *Corynebacterium* spp.

SUÍNOS

Pneumonia (*Pasteurella* spp., *Haemophilus* spp. e *Mycoplasma* spp.), leptospirose (*Leptospira* spp.), erisipela (*Erysipelothrix* spp.), enterite, artrite, Mastite-Metrite-Agalaxia (complexo MMA) e feridas infectadas causadas por *Streptococcus* spp., *Staphylococcus* spp., *Escherichia coli* e *Corynebacterium* spp.

MODO DE USO E DOSAGEM

Diclotril® deve ser administrado pelas vias intravenosa ou intramuscular, na dosagem de 1 mL para cada 40 kg de peso corpóreo, o que corresponde a 2,5 mg de Cloridrato de Enrofloxacinina e 0,9375 mg de Diclofenaco de Sódio para bovinos e suínos. Nos casos de infecções graves e anaplasmose, aplicar 1 mL para cada 20 kg de peso corpóreo, a cada 24 horas, durante 3 a 5 dias, se necessário prolongar o tratamento por mais 2 dias. Recomendamos a continuidade do tratamento por até 48 horas após o desaparecimento do quadro clínico. As dosagens e os intervalos entre os tratamentos poderão ser alterados a critério do Médico Veterinário.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Obedecer as dosagens indicadas para a aplicação do produto. Utilizar seringa e agulha estéreis, observando as boas práticas de assepsia. Durante o tratamento é importante o acompanhamento dos animais portadores de sintomas de distúrbios gastrointestinais, com histórico de ulceração gástrica ou intestinal.

EFEITOS COLATERAIS

O produto não apresenta efeitos colaterais quando obedecido o modo de uso e dosagem.

CONTRAINDICAÇÕES

Não aplicar em animais com histórico de hipersensibilidade conhecida aos componentes da formulação. Não aplicar em animais com grave disfunção renal, pois há riscos de nefrotoxicidade. Não administrar o Diclotril® em animais com ulcerações gástricas e/ou intestinais. Em bezerras, doses superiores a 30 mg/kg por 14 dias origina lesões articulares e a 60 mg/kg podem ser observadas lesões a nível renal. Não usar em equinos, pois pode haver erosão na cartilagem dos ossos largos.

15 cm

7,5 cm



J.A Saúde Animal

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Aplicações simultâneas de Diclitolril® com outros anti-inflamatórios não hormonais levam a uma interação sinérgica, potencializando os efeitos de ambos, podendo acarretar uma superdosagem anti-inflamatória, aumentando a possibilidade de distúrbio gastrointestinal, como por exemplo, a ulceração gástrica. O Cloridrato de Enrofloxacin se antagoniza com macrolídeos e tetraciclina frente a *Streptococcus* e *Enterococcus* e em geral antagonizam também com o Cloranfenicol. Não administrar Diclitolril® concomitantemente com outros anti-inflamatórios, Metotrexato e Trianterene, podendo ocorrer toxicidade severa ou fatal.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Conservar em local seco e fresco, à temperatura ambiente entre 15 °C e 30 °C, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

"ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA"

BOVINOS:

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 30 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 7 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

SUÍNOS:

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 13 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 8.999 em 03/12/2004.

Responsável Técnico: Dr. José Abdo de Andrade Hellú
CRMV-SP 1.938

APRESENTAÇÃO

Frasco-ampola contendo 10 mL, 50 mL, 100 mL e 250 mL do produto.



J.A Saúde Animal

Proprietário e Fabricante: **J.A. Saúde Animal**
Travessa José Coelho de Freitas, 1679, Centro, CEP: 14.415-000
Patrocínio Paulista - SP Tel/fax: (16) 3145-9920
CNPJ: 03.749.465/0001-38
www.jasaudeanimal.com.br



Indústria Brasileira



SAC 0800 774 4334

15 cm

048_19