

7,5 cm



J.A Saúde Animal

# EGG PPU



## USO VETERINÁRIO

### FÓRMULA

Cada 100 mL do produto contém:

Éter Gliceril Guaiacol ..... 10 g  
Veículo q.s.p. .... 100 mL

### INDICAÇÕES

O EGG-PPU é indicado para equinos em protocolos de indução anestésica nos procedimentos de curta duração, a campo, em clínicas e hospitais para grandes animais, como na realização de anestesia total intravenosa na associação com Xilazina e Cetamina (na forma de infusão contínua), para procedimentos de longa duração.

### MODO DE USO E DOSAGEM

Administrar por via intravenosa em dose única. Para indução anestésica administrar de forma rápida 1 mL do produto por kg de peso vivo do animal (equivalente a 100 mg/kg de Éter Gliceril Guaiacol).

A dose recomendada para manter a anestesia cirúrgica de longa duração na associação do EGG-PPU com Cetamina e Xilazina é:

EGG-PPU	Xilazina 10%	Cetamina 10%
50,0-100,0 mg/mL	0,5-1,0 mg/mL	1,0-4,0 mg/mL

Taxa de infusão de 0,5 a 2,0 mL/kg/hora

### PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Antes de utilizar o produto recomenda-se fazer hemograma completo, função renal, função hepática e exame clínico completo. Deixar os animais em jejum (8 horas alimentar e 4 horas hídrico) para diminuir o risco de regurgitação. Realizar tricotomia e anti-sepsia prévia no local da administração.

Obedecer à dose preconizada, sendo administrado exclusivamente por via endovenosa por um Médico Veterinário. Deve-se ter cuidado ao administrar este medicamento em pacientes com história de reações alérgicas ao Éter Gliceril Guaiacol.

O animal deve ser cuidadosamente monitorado durante todo o procedimento até o término do efeito da anestesia.

A segurança não foi avaliada em animais jovens e em éguas prenhes.

### EFEITOS COLATERAIS

A aplicação extravascular acidental pode provocar inflamação tecidual, tromboflebite, edema e necrose tecidual.

### CONTRAINDICAÇÕES

O produto não deve ser usado por pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

Não se recomenda o uso em pacientes que apresentem tromboflebite já estabelecida ou condições que predisponham ao desenvolvimento de alterações vasculares.

15 cm

7,5 cm



**J.A Saúde Animal**

É contraindicado o EGG-PPU como agente único para a realização de procedimentos cirúrgicos, pois este agente possui mínimas propriedades sedativas e analgésicas. Por esse motivo, é usado em associação (com sedativos, anestésicos injetáveis, anestésicos inalatórios e anestésicos locais) para induzir ou manter a anestesia em grandes animais.

#### **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS**

Não foram encontradas interações com outros fármacos.

#### **CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO**

Conservar em local seco e fresco, à temperatura ambiente entre 15 °C e 30 °C, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

#### **VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.**

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 9.744 em 07/10/2013.

Responsável Técnico: Dr. José Abdo de Andrade Hellú  
CRMV-SP 1.938

#### **APRESENTAÇÃO**

Bolsa plástica contendo 500 mL do produto.

15 cm



**J.A Saúde Animal**

083\_04

Proprietário e Fabricante: **J.A. Saúde Animal**  
Travessa José Coelho de Freitas, 1679, Centro, CEP: 14.415-000  
Patrocínio Paulista - SP Tel/fax: (16) 3145-9920  
CNPJ: 03.749.465/0001-38  
[www.jasaudeanimal.com.br](http://www.jasaudeanimal.com.br)



Indústria Brasileira



SAC 0800 774 4334