

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Conservar em local seco e fresco, à temperatura ambiente entre 15 °C e 30 °C, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

"ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA"

EQUINOS:

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO, SOMENTE DEVE SER REALIZADO 24 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTE CARTUCHO-BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 6.657 em 05/01/1999.

Responsável Técnico: Dr. José Abdo de Andrade Hellú
CRMV-SP 1.938

APRESENTAÇÃO

Seringa plástica dosadora contendo 25 g de pasta.

Proprietário: **J.A. Saúde Animal**

Travessa José Coelho de Freitas, 1679, Centro, CEP: 14.415-000

Patrocínio Paulista - SP Tel/fax: (16) 3145-9920

CNPJ: 03.749.465/0001-38

www.jasaudeanimal.com.br



Indústria Brasileira

SAC 0800 774 4334

Fabricante: **Farmacampo Saúde Animal**

Av. das Andorinhas, 268, Parque dos Pássaros

CEP: 15.093-600 - São José do Rio Preto - SP

CNPJ: 03.386.228/0001-50

FÓRMULA

Cada 100 g do produto contém:

Ivermectina	0,40 g
Pamoato de Pirantel	38,30 g
Veículo q.s.p.	100,00 g

INDICAÇÕES

Antiparasitário de amplo espectro, para tratamento e controle das parasitoses internas dos equinos, causadas por:

Grandes estrôngilos: *Strongylus vulgaris*, *Strongylus edentatus*, *Strongylus equinus*. Pequenos estrôngilos: *Cyathostomum* spp., *Cylicostephanus* spp., *Cylicodontophorus* spp., *Cylicocyclus* spp. Outros: *Trichostrongylus axei*, *Parascaris equorum*, *Oxyuris equi*, *Probstmayria vivipara*, *Strongyloides westeri* e larvas de *Gasterophilus* spp.

MODO DE USO E DOSAGEM



Via oral, sobre a língua do animal, no fundo da boca que deve estar sem alimento.

Dose terapêutica: 200 mcg de Ivermectina + 6,6 mg de Pirantel base/kg de peso corpóreo.

A seringa contém pasta suficiente para tratar um animal de 500 kg de peso corpóreo, vide tabela:

Peso corpóreo (kg)	Dose (g)
100	5,0
200	10,0
300	15,0
400	20,0
500	25,0

Obs.: Dose única - a repetição da dose e sua frequência, fica a critério do Médico Veterinário. Em caso de alta infestação por cestódeo, utilizar duas vezes a dose indicada.



329_03