

7,5 CM



J.A Saúde Animal

Intrasec VS®



USO VETERINÁRIO

Suspensão intramamária
Produto Estéril

FÓRMULA

Cada seringa do produto contém:

Cloxacilina Benzatina (como base ativa) 600 mg

Veículo oleoso de liberação prolongada q.s.p. 8 g

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

O Intrasec VS® é uma suspensão intramamária com Cloxacilina Benzatina, a qual é uma penicilina semi-sintética de ação prolongada em um veículo oleoso de liberação lenta, o qual assegura uma atividade bacteriana de mais de 3 semanas. Isso facilita a resolução das infecções não curadas durante a lactação e previne as mastites durante a primeira metade do período de secagem, incluindo as causadas por microrganismos resistentes à penicilina e a outros antibióticos.

INDICAÇÕES

Tratamento e profilaxia das mastites causadas por *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus* sp. (coagulase negativos), *Streptococcus agalactiae*, *dysgalactiae* e *uberis*, no período seco de vacas leiteiras, sensíveis ao princípio ativo da formulação.

MODO DE USO E DOSAGEM

- 1) Ordenhar a fundo o quarto mamário a ser secado;
- 2) Desinfetar a ponta do teto com um pouco de algodão embebido preferencialmente em álcool 70% ou em álcool comum;
- 3) Remover a tampa protetora da seringa, tomando cuidado para não tocar a cânula intramamária com os dedos;
- 4) Deixar sair uma gota do produto para lubrificar;
- 5) Introduzir a cânula intramamária no conduto do teto, o mínimo imprescindível para a aplicação do produto;
- 6) Injetar totalmente o conteúdo da seringa;
- 7) Massageie o teto e a parte inferior do úbere de forma ascendente;
- 8) Imergir o teto em um banho antisséptico adequado.

CONTRAINDICAÇÕES

Animais com antecedentes de hipersensibilidade a antibióticos betalactâmicos. Os casos de alergia são muito pouco frequentes, porém no caso da ocorrência de algum, tratar com epinefrina ou anti-histamínicos, conforme necessário. A sensibilidade à penicilina pode levar a reações cruzadas com as cefalosporinas e vice-versa. Não administrar o produto com outros antibióticos e bacteriostáticos.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

A associação de antibióticos bactericidas com princípios ativos bacteriostáticos é contraindicado, pois tais reações podem produzir

15 CM

7,5 CM



J.A Saúde Animal

um fenômeno de antagonismo com perda de eficiência do produto. Assim sendo não é recomendado o uso conjunto de penicilina e antibióticos do grupo das tetraciclina, macrolídeos e quimioterápicos do grupo das sulfonamidas.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Conservar em local seco e fresco, à temperatura ambiente entre 15 °C e 30 °C, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

"ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA"

BOVINOS:

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 30 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 30 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

O TRATAMENTO DEVE SER REALIZADO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTES DA DATA DE PARIÇÃO PREVISTA, PARA QUE NÃO PERMANEÇAM RESÍDUOS INDEVIDOS DE ANTIBIÓTICO NO TÉRMINO DA ETAPA DO COLOSTRO. O PRODUTO É INDICADO SOMENTE PARA VACAS EM PERÍODO SECO.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 8.947 em 18/08/2004.

Responsável Técnico: Dr. José Abdo de Andrade Hellú
CRMV-SP 1.938

APRESENTAÇÃO

Seringa plástica contendo 8 gramas do produto.
Caixa coletiva contendo 24 unidades.



Proprietário e Fabricante: **J.A. Saúde Animal**
Travessa José Coelho de Freitas, 1679, Centro, CEP: 14.415-000
Patrocínio Paulista - SP Tel/fax: (16) 3145-9920
CNPJ: 03.749.465/0001-38
www.jasaudeanimal.com.br



Indústria Brasileira



SAC 0800 774 4334

15 CM

129_13