



Mastite Clínica VL



USO VETERINÁRIO

Antimicrobiano intramamário para
tratamento das mastites clínicas

FÓRMULA

Cada seringa de 8 g do produto contém:

Amoxicilina Trihidratada	200 mg
Clavulanato de Potássio	50 mg
Acetato de Prednisolona	10 mg
Veículo oleoso de liberação rápida q.s.p.	8 g

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Mastite Clínica VL é uma associação de Amoxicilina e Clavulanato de Potássio de amplo espectro e intensa ação bactericida. É adequada para o combate de microrganismos sensíveis aos princípios ativos da formulação, causadores de inflamação no úbere de vacas em lactação. Administração intramamária.

INDICAÇÕES

Tratamento de mastite clínica de vacas em lactação, causadas por *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus* sp. (coagulase negativos), *Streptococcus agalactiae*, *dysgalactiae* e *uberis*, *Corynebacterium* sp., *Actinomyces* sp. e *Escherichia coli*.

Posologia: Aplicar 8 g para cada quarto afetado, a cada 12 horas, até três aplicações.

INSTRUÇÕES DE USO

- 1) Ordenhar até o esgotamento do leite do quarto mamário afetado;
- 2) Desinfetar a ponta do teto com um pouco de algodão embebido preferencialmente em álcool 70% ou em álcool comum;
- 3) Remover a tampa protetora da seringa, tomando cuidado para não tocar a cânula intramamária com os dedos;
- 4) Deixar sair uma gota do produto para lubrificar;
- 5) Introduzir a cânula intramamária no conduto do teto, o mínimo imprescindível para aplicação do produto;
- 6) Injetar totalmente o conteúdo da seringa;
- 7) Massagear o teto e a parte inferior do úbere de forma ascendente;
- 8) Imergir o teto em um banho antisséptico adequado.

EFEITOS COLATERAIS

Hipersensibilidade de tipo geral (anafilaxia) em animais com antecedentes de alergia às penicilinas.

CONTRAINDICAÇÕES E LIMITAÇÕES DE USO

Animais com antecedentes de hipersensibilidade a antibióticos beta-lactâmicos. Os casos de alergia são muito pouco frequentes, porém, no caso da ocorrência de algum, tratar com epinefrina ou anti-histamínicos, conforme necessário.



PRECAUÇÕES

Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Conservar em local seco e fresco, à temperatura ambiente entre 15 °C e 30 °C, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

"ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA"

BOVINOS:

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 12 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 60 HORAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 8.590 em 29/04/2003.

Responsável Técnico: Dr. José Abdo de Andrade Hellú
CRMV-SP 1.938

APRESENTAÇÃO

Seringa plástica contendo 8 gramas do produto.

Caixa coletiva contendo 24 unidades.



J.A. Saúde Animal

Proprietário e Fabricante: **J.A. Saúde Animal**

Travessa José Coelho de Freitas, 1679, Centro CEP: 14.415-000

Patrocínio Paulista - SP Tel/fax: (16) 3145-9920

CNPJ: 03.749.465/0001-38

www.jasaudeanimal.com.br



Indústria Brasileira



SAC 0800 774 4334