

7,5 cm



J.A Saúde Animal

# Vetsulfa

## USO VETERINÁRIO



Antimicrobiano e Anti-inflamatório

### FÓRMULA

Cada 100 mL do produto contém:

Sulfametoxazol .....	20 g
Trimetoprim .....	4 g
Diclofenaco de Sódio .....	375 mg
Veículo q.s.p. ....	100 mL

### INDICAÇÕES

Vetsulfa é um produto de ação sinérgica, bactericida, indicado para o tratamento de diversas enfermidades causadas por agentes Gram-positivos e Gram-negativos que acometem os bovinos e equinos, causadas por agentes etiológicos sensíveis ao espectro de ação da associação Sulfametoxazol e Trimetoprim. Indicado no tratamento de infecções bacterianas como:

#### BOVINOS

Mastite (*Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus uberis*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Staphylococcus aureus*, *Corynebacterium pyogenes*, *Escherichia coli*), infecções respiratórias (*Pasteurella multocida*), metrite (*Corynebacterium pyogenes*, *Escherichia coli*), pielonefrite bovina (*Corynebacterium renale*), hepatite necrótica infecciosa (*Clostridium novyi*), doenças supurativas (*Corynebacterium pyogenes*), infecções urinárias (*Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Escherichia coli*), diarreias e gastroenterites (*Escherichia coli*, *Salmonella spp.*).

#### EQUINOS

Garrotilho (*Streptococcus equi*), metrite (*Corynebacterium pyogenes*), pneumonia corinebacteriana (*Corynebacterium equi*), doenças supurativas (*Corynebacterium pyogenes*).

Vetsulfa reduz o processo inflamatório, a dor e a febre, pela ação do Diclofenaco de Sódio estimulando o animal a se alimentar, acelerando a recuperação da enfermidade.

### MODO DE USO E DOSAGEM

Vetsulfa deve ser administrado pelas vias intramuscular, intravenosa ou subcutânea, na dosagem de 2 mL para cada 15 kg de peso corpóreo, o que corresponde a 26,6 mg de Sulfametoxazol, 5,3 mg de Trimetoprim e 0,5 mg de Diclofenaco de Sódio, a cada 24 horas, durante 3 a 5 dias consecutivos ou à critério do Médico Veterinário.

Recomendamos a continuidade do tratamento por até 48 horas após o desaparecimento do quadro clínico.

### PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Obedecer as dosagens indicadas para a aplicação do produto. Utilizar seringas e agulhas estéreis, observando as boas práticas de assepsia. Durante o tratamento é importante o acompanhamento dos animais portadores de sintomas de distúrbios gastrintestinais, com histórico de ulceração gástrica ou intestinal. Superdosagens acidentais podem ser revertidas com injeção intramuscular de Ácido Fólico. Respeitar o prazo de validade do produto.

### EFEITOS COLATERAIS

O tratamento prolongado pode causar distúrbios gastrintestinais, como náuseas e vômitos, que podem ser minimizados pela administração do produto junto com alimentos. Distúrbios do rim e das vias urinárias podem ocorrer após tratamentos muito prolongados com sulfonamidas.

15 cm

7,5 cm



**J.A Saúde Animal**

#### **CONTRAINDICAÇÕES**

Não aplicar em animais com problema de disfunção renal ou hepática. Não aplicar em animais com histórico de hipersensibilidade à Sulfametoxazol, Trimetoprim ou ao Diclofenaco de Sódio. Não administrar em animais com ulcerações gástricas e/ou intestinais.

#### **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS**

Não administrar a animais que estejam recebendo tratamento com Fenitoína. Alguns anestésicos derivados do ácido p-aminobenzoico (Procaína, Tetracaína, Butacaína e Benzocaína) podem antagonizar o mecanismo de ação dos sulfonamídicos. A administração concomitante de Ácido Folinico pode antagonizar o mecanismo de ação dos sulfonamídicos. Não administrar a animais que estejam recebendo tratamento com Ciclosporina.

#### **CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO**

Conservar em local seco e fresco, à temperatura ambiente entre 15 °C e 30 °C, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

#### **"ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA"**

##### **BOVINOS:**

**ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 37 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.**

**LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 5 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.**

**EQUINOS: O PRODUTO NÃO DEVE SER ADMINISTRADO EM EQUINOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO.**

**A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.**

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.**

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 9.025 em 17/01/2005.

Responsável Técnico: Dr. José Abdo de Andrade Hellú  
CRMV-SP 1.938

#### **APRESENTAÇÃO**

Frasco-ampola contendo 50 mL e 100 mL do produto.



**J.A Saúde Animal**

Proprietário e Fabricante: **J.A. Saúde Animal**  
Travessa José Coelho de Freitas, 1679, Centro, CEP: 14.415-000  
Patrocínio Paulista - SP Tel/fax: (16) 3145-9920  
CNPJ: 03.749.465/0001-38  
[www.jasaudeanimal.com.br](http://www.jasaudeanimal.com.br)



Indústria Brasileira



SAC 0800 774 4334

15 cm

055\_14