

7,5 cm



J.A Saúde Animal

Prador[®]



USO VETERINÁRIO

Anti-inflamatório, analgésico e antitérmico à base de Meloxicam e Dipirona Sódica

FÓRMULA

Cada 100 mL do produto contém:

Meloxicam	1,0 g
Dipirona Sódica	50,0 g
Veículo q.s.p.	100,0 mL

INDICAÇÕES

O produto Prador[®] é um potente anti-inflamatório, não narcótico, não esteroidal, com atividades analgésicas e antitérmicas, recomendado nos casos de inflamação, dor e/ou febre para equinos.

A eficácia desse produto não foi avaliada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

MODO DE USO E DOSAGEM

O produto Prador[®] deve ser administrado na dosagem de 1 mL para cada 25 kg de peso corpóreo, o que corresponde a 0,4 mg de Meloxicam e 20 mg de Dipirona Sódica por kg de peso corpóreo, por via intramuscular ou endovenosa com administração de 12 a 24 horas, de três a cinco dias consecutivos, dependendo da gravidade do caso, a critério do Médico Veterinário.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Respeitar às indicações e o modo de uso e dosagem do produto;
Obedecer às condições de armazenamento do produto;
Utilizar seringas e agulhas estéreis, observando as boas práticas de assepsia;
Não reaproveitar as embalagens vazias, que devem ser destruídas por incineração;
Evite fumar ou alimentar-se durante o manuseio;
Lavar as mãos após o manuseio do produto;
Não guardar o produto próximo a alimentos, bebidas e produtos de higiene pessoal;
O medicamento deve ser utilizado sob a orientação de um Médico Veterinário.

EFEITOS COLATERAIS

Em animais que apresentam comprometimento prévio, o Meloxicam pode causar efeitos relativos ao sistema gastrointestinal, como inapetência, gastrite, ulcerações e hemorragias e/ou agravar quadros de doenças renais e hepáticas. No caso de altas doses de Dipirona Sódica, podem resultar em danos à medula óssea do cavalo, que se manifesta por produção de células sanguíneas anormais. Outras reações adversas incluem: dor no local da injeção, reações de pele, anemia hemolítica, tremores e anafiláticas (alérgicas), agranulocitose, leucopenia e convulsões.

CONTRAINDICAÇÕES

Não administrar o produto em animais com histórico de hipersensibilidade ao Meloxicam e/ou Dipirona Sódica;
Não administrar em equinos gestantes ou lactantes;
Não administrar em equinos com patologias gastrointestinais, tais como irritação e hemorragia, insuficiência hepática, cardíaca ou renal e distúrbios hemorrágicos;
Não administrar em equinos com idade inferior a 6 semanas;
Não utilizar o produto com o prazo de validade vencido.

15 cm

7,5 cm



J.A Saúde Animal

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Não administrar simultaneamente com glicocorticoides, outros medicamentos anti-inflamatórios não esteroides;
Não administrar simultaneamente com anticoagulantes, pois pode aumentar o risco de sangramentos;
Não utilizar em associação com o Atenolol, pois pode diminuir seu efeito e levar a hipertensão;
Não utilizar em associação com a Ciclosporina, devido sua nefrotoxicidade;
Não utilizar em associação com a Colestiramina, pois pode diminuir o efeito terapêutico do Meloxicam;
Não utilizar em associação com substâncias inibidoras da Enzima Conversora de Angiotensina (ECA), pois pode diminuir seu efeito terapêutico;
Não utilizar em associação com o Lítio, pois pode aumentar sua toxicidade;
Não utilizar em associação com o Metotrexano, pois pode aumentar sua toxicidade;
Não utilizar em associação com o Ácido Acetilsalicílico, pois pode aumentar o risco de sangramento gastrointestinal;
Não utilizar em associação com o Furosemida, pois pode diminuir o efeito terapêutico de ambas substâncias;
Não utilizar em associação com o Losartano, pois pode causar hipotensão e/ou nefrotoxicidade;
Não utilizar em associação com o Propranolol, pois pode diminuir o efeito terapêutico do mesmo.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Conservar em local seco e fresco, à temperatura ambiente entre 15 °C e 30 °C, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos. O produto apresenta prazo de validade de dois (2) anos após a data de fabricação. Utilizar o produto até doze (12) meses após a primeira aplicação.

"ATENÇÃO: OBEDECER AO SEGUINTE PERÍODO DE CARÊNCIA"

EQUINOS: O PRODUTO NÃO DEVE SER ADMINISTRADO EM EQUINOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Licenciado provisoriamente no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 156/2019 em 15/03/2019.

Responsável Técnico: Dr. José Abdo de Andrade Hellú
CRMV-SP 1.938

APRESENTAÇÃO

Frasco vidro âmbar contendo 20 mL, 50 mL e 100 mL do produto.



J.A Saúde Animal

Proprietário e Fabricante: **J.A. Saúde Animal**
Travessa José Coelho de Freitas, 1679, Centro, CEP: 14.415-000
Patrocínio Paulista - SP Tel/fax: (16) 3145-9920
CNPJ: 03.749.465/0001-38
www.jasaudeanimal.com.br



Indústria Brasileira



SAC 0800 774 4334

15 cm

20_362_02